

Suivi rucher au 22/09/18

Traitement AF du 21/09 :

Méthode CHAPLEAU pour 19 colonies :

30 ml d'AF à 60%. Lavette déposée sur un plateau d'hivernage NICOT, glissé sous la ruche

Seule la n° 634 a été traitée par le haut, avec la même quantité. Lavette posée sur un carré de plastique sur les têtes de cadres. Couvre-cadre retourné pour constituer une chambre d'évaporation.

Résultats :

Comptage varroa du 22/09	N° ruches	%
nb<10	612 - 634	11%
10<nb<20	604 - 606 - 629 - 630 - 633	26%
20<nb<50	610 - 611 - 622 - 627 - 628	26%
50<nb<100	620 - 626	11%
nb>100	603 - 608 - 609 - 614 - 615	26%

Sur les 10 premières heures du traitement, la plage des températures a été de 18° à 25°, correspondant à l'optimum préconisé.

L'infestation est forte et même très forte. Le traitement APILIFE effectué le 24/08 ne semble pas avoir été efficace. Cause : température excessive ? (idem pour le traitement AF de la n°620)

Les plateaux étant bombés, qq difficultés introduire et retirer l'ensemble plateau/lavette.

Samedi 22/09, lors du contrôle, le produit n'était pas totalement évaporé dans la majorité des ruches. Compte tenu de la baisse des températures, une journée supplémentaire aurait été nécessaire. Un peu de pluie la veille, certains plateaux plus exposés ont récupéré de l'eau

Colonies et reines rucher :

Année	Marquées	Non marquées	Nb	%
2018 ROUGE	603 - 604 - 608 - 610 - 612 - 615 620 - 626 - 628 - 629 - 633 - 806 818 - WAR - DIV821 - DIV823	606 - 622 - 634 - DIV822	20	80%
2017 JAUNE	611 - 614		2	8%
2016 BLANC	609 - 627 - 630		3	12%
2015 BLEU			0	0%
2014 VERT			0	0%
Total :			25	

Après introduction des deux reines, nous disposons de 25 colonies, réparties comme suit :

- Dadant : 19 colonies
- Warré : 1 colonie
- Divisibles Dadant : 3 colonies

- Ruchettes Dadant : 2 colonies

Entrée en hivernage avec un taux de reine 2018 élevé (80 %) et un taux de reines de moins de deux ans de 88%

Dix reines, dont la filiation est connue, sont issues de l'ER (40%)

Poids des colonies:

Toutes les colonies ont été pesées et ont retrouvé leurs poids après récolte. Sauf cas particulier (n°612), on peut arrêter les nourrissements.

Le pillage semble s'être calmé. A surveiller la n° 604 et également les n° 611 & 615 qui ont une fâcheuse propension au pillage

les reines ont repris leur ponte, du pollen est rentré mais peu de nectar. Pour passer l'hiver, les provisions sont limitées dans quasi toutes les colonies

Les balances OPTIBEE semblent indiquer une légère reprise de l'activité

CTRL reines introduites :

Ruchettes 806 : F205 & 816 : F206

La reine introduite en n°806 est toute petite et semble avoir été mal fécondée

Travaux à effectuer au rucher :

Traitement complémentaire des 3 divisibles, des 2 ruchettes et de la WARRE

Contrôle chute naturelle varroa dans 8 jours. Deuxième passage à l'AF, si nécessaire

Hivernage à poursuivre (partitions)

Préparation des cadres corps filés avec amorces (60 et +) et reprise des vieux cadres dans les congels pouvant constituer une amorce

Faire de la place dans les deux congélateurs, en stockant, à l'extérieur, les cadres propres ; comme le sont les cadres de hausse ?

Nettoyage plateaux Nicot (en cours)

Séance gaufrage cire

Entretien extérieur rucher